DOI: 10.32751/2310-4910-2021-28-2-5

УДК 616.831-005.6

І. С. БОГДАН, А. І. БОГДАН

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Тромбоз венозних синусів головного мозку внаслідок ускладненого перебігу COVID-19: клінічний випадок

Незважаючи на те, що сучасна пандемія коронавірусної хвороби 2019 р. (COVID-19) найчастіше асоціюється з гострим респіраторним дистрес-синдромом, за час світової боротьби з даною інфекцією надбані докази про мультисистемне ураження організму з високим ризиком тромботичних подій. На противагу артеріальним тромбозам венозні тромбози центральної нервової системи є рідкісним ускладненням, але становлять значну проблему не лише з позицій ефективного лікування, а й при діагностиці цього стану. В даній статті ми демонструємо та аналізуємо клінічний випадок венозного тромбозу дуральних синусів у пацієнта з важким перебігом COVID-19.

Мета. Підвищити настороженість щодо виникнення церебрального венозного тромбозу дуральних синусів при веденні пацієнтів з COVID-19.

Результати та їх обговорення. Наведено дані пацієнта з раптовим виникненням цефалгічного синдрому, парезу відповідного нерва з набряком м'яких тканин орбіти, у якого після первинно негативного тесту на коронавірус діагностовано тромбоз венозних синусів головного мозку на фоні COVID-19.

Висновки.

1. COVID-19 часто супроводжується гіперкоагуляцією та тромботичними ускладненнями.

2. Церебральний венозний тромбоз дуральних синусів асоційований з коронавірусною інфекцією є гострим та невідкладним станом, потребує високої настороженості лікарів, які ведуть пацієнтів з COVID-19, неврологів, нейрохірургів з метою невідкладного призначення антикоагулянтної терапії у ефективних дозах, вирішення подальшої тактики ведення пацієнта.

3. Справжня частота церебрального венозного тромбозу синусів серед інфікованих SARS-CoV-2 недооцінена. Важливо, що раптовий початок інтенсивного головного болю з новими нехарактерними раніше властивостями є неспецифічним, проте кардинальним симптомом тромбозу венозних синусів мозку, що повинно насторожувати кожного фахівця, який спостерігає хворих з коронавірусною хворобою.

Ключові слова: тромбоз венозних синусів головного мозку, церебральний венозний тромбоз дуральних синусів, церебральний венозний тромбоз, COVID-19, коронавірусна хвороба.

Хоча вірус SARS-CoV-2 первинно вважався респіраторним патогеном, все частіше описують тромботичні та неврологічні ускладнення, які призводять до високого рівня смертності та інвалідизації [6]. Внаслідок ендотеліальної дисфункції, цитокінового шторму, активації тромбоцитів у осіб з COVID-19 виникає значна схильність до формування артеріальних та венозних тромбозів [10].

Венозний тромбоемболізм вважається одним з найвагоміших чинників смертності та ускладненого перебігу у пацієнтів з COVID-19 як серед тих, хто перебуває в реанімації, так і серед загального госпіталізованого контингенту, незважаючи навіть на отримання ними антикоагулянтної терапії [13]. За даними літератури, основною причиною раптової смерті при інфікуванні SARS-CoV-2 є тромбози легеневих судин [15]. Формування тромбофілії у венозній системі є характерною властивістю вірусу, потребує своєчасної підозри, діагностики та відповідного лікування.

Описи випадків церебрального венозного тромбозу синусів під час перебігу COVID-19 публікуються все частіше, відкриваючи перед нами важливу проблему у своєчасній діагностиці, захисту головного мозку та лікуванні цих станів [1, 17–19]. За даними оглядів літератури та когортних клінічних досліджень, описано 57 випадків церебральних венозних тромбозів серед госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою, що становить 8,0–8,8 випадку на 1 млн населення [2, 3]. Справжня частота церебрального венозного тромбозу синусів серед інфікованих SARS-CoV-2 недооцінена. Важливо, що раптовий початок інтенсивного головного болю з новими нехарактерними раніше властивостями, є неспецифічним, проте кардинальним симптомом тромбозу венозних синусів мозку, що повинно насторожувати кожного фахівця, який спостерігає хворих з коронавірусною хворобою.

Аналіз клінічного випадку спрямований на поглиблення розуміння виникнення церебрального венозного тромбозу синусів, окреслення чинників ризику з метою запобігання виникнення затримки в діагностиці та початку патогенетичного лікування даного тромботичного ускладнення при огляді неврологом та нейрохірургом.

Клінічний випадок. Тридцятирічний чоловік зі скаргами впродовж двох діб на лихоманку, кашель та задишку був госпіталізований до лікувального закладу третього рівня надання медичної допомоги. При поступленні діагностовано двобічну пневмонію. Полімеразно-ланцюговою реакцією (ПЛР) в назофарингеальному мазку ДНК SARS-CoV-2 не виявлено, проте згідно з клінічними та радіологічними критеріями Європейського центру контролю захворювань було встановлено можливий діагноз COVID-19 [4].

Пациєнт проходив лікування в ізольованій палаті згідно з рутинним протоколом коронавірусної хвороби. Результати лабораторних досліджень, проведених при госпіталізації пацієнта, асоціювалися з низьким ризиком важкого перебігу інфекції: рівень фібриногену 6,4 г/л, лейкоцитів 12×10^9 /л, співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів 3,74 [12].

Раптово на третю добу госпіталізації у хворого виник інтенсивний біль в грудній клітці праворуч, що супроводжувався гострою дихальною недостатністю. Комп'ютерна томографія грудної клітки виявила правобічну деструкцію легеневої тканини на фоні двобічної пневмонії, пневмогідроторакс праворуч. Був двічі проведений торакоцентез та пасивне дренивання правої плевральної порожнини.

На п'яту добу у пацієнта виник лівобічний головний біль пульсуючого характеру, поєднаний з появою раптового болючого набряку та венозної гіперемії м'яких тканин лівої орбіти, парезом лівих відвідного, офтальмічного нервів. Клінічне погіршення у вигляді неврологічного ускладнення супроводжувалося підвищенням рівня фібриногену до 9,4 г/л, D-димера – до 1593,8 нг/мл, С-реактивного білка – до 19,4 Од/л. Співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів утримувалося на попередньому рівні. Цього ж дня при повторному проведенні ПЛР виявлено ДНК SARS-CoV-2. Невідкладна магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку, МР-венографія виявили відсутність потоку крові в лівому поперечному та часткове порушення кровотоку в лівому кавернозному синусах. МРТ ознаки ішемічних, геморагічних змін мозкової речовини були відсутні, в лівій гайморовій пазусі візуалізувалися рідина, що відповідала екссудату, і потовщення слизової оболонки.

Зрізи МРТ головного мозку пацієнта представлені на рисунку 1. Беручи до уваги синдром кавернозного синусу, високі титри фібриногену та D-димеру, МР-картину, хворому встановлено діагноз: гострий венозний тромбоз поперечного, частковий тромбоз кавернозного дуральних синусів зліва, вторинний неврит відвідного та очної гілки трійчастого нервів зліва на фоні важкого перебігу COVID-19.

Розпочато введення терапевтичних доз низькофракційованого гепарину – еноксипарину 120 мг на добу, неостигміну 1 мг на добу. З метою лікування гострого синуситу виконано пункцію, санацію лівої гайморової пазухи та дренивання її гнійного вмісту на фоні системної антибіотикотерапії.

Поступово у хворого регресував головний біль, набряк тканин лівої орбіти. В подальшому на час виписки виконана конверсія на таблетовану форму парентеральних антикоагулянтів, призначених з динамічним спостереженням.

Рис. 1. МРТ головного мозку пацієнта, виконана при виникненні синдрому кавернозного синусу

При контрольному огляді через 2,5 міс від початку захворювання на фоні лікування у хворого мало місце клінічне покращення, що полягало у зменшенні головного болю, відновленні функції відповідного та офтальмічного нервів. Контрольне МРТ головного мозку вказувало на ознаки реканалізації тромбів з відновленням кровотоку в лівих кавернозному та поперечному дуральних синусах (рис. 2).

А. Має місце відновлення сигналу від лівого поперечного синусу

В. На T2 послідовності спостерігається регрес ознак набряку, відновлення нормальних характеристик сигналу від лівого кавернозного синусу

С. На T2 послідовності в аксильній проекції просвіт лівого поперечного синусу прохідний, з ознаками реканалізації тромбу

Е. Ліва гайморова пазуха без особливостей в T2 режимі

Рис. 2. МРТ головного мозку пацієнта через 2,5 місяці від початку захворювання

Чимало останніх досліджень відмітило високу частоту виникнення венозних та артеріальних тромбозів у пацієнтів з COVID-19 [11, 13]. Хоча церебральний венозний тромбоз діагностують рідше при коронавірусній хворобі, ніж інші тромботичні ускладнення, смертність та інвалідизація осіб молодого віку значна [7].

Минає другий рік пандемії і ми починаємо розуміти механізми коагулопатії при COVID-19 [8]. У хворих виявляють високий рівень фактора згортання VIII, фактора фон Віллебрандта, фібриногену, D-димеру, циркулюючих протромботичних мікрочастинок, таких як антифосфоліпідні антитіла [19]. Активність SARS-CoV-2 сама по собі має високі тромбогенні характеристики. Важливо, що ангіотензинперетворювальний фермент (АПФ) 2, первинний рецептор, який використовує вірус для проникнення в клітину, експресується не тільки в легенях, а й в центральній нервовій системі та на клітинах ендотелію судин [16]. Гістологічно підтверджені вірусний ендотеліт та комплемент-індуковане тромботичне пошкодження судин запускають тріаду гіперкоагуляції Вірхова [18]. У нашого пацієнта важливою патогенетичною складовою став і гострий гнійний синусит, який, за даними літератури, підвищує вірогідність виникнення церебрального венозного тромбозу [14].

Високий титр антифосфоліпідних антитіл характерний для пацієнтів з важким перебігом COVID-19, ускладненого тромбозом венозних синусів головного мозку [5]. У даного пацієнта рівень IgM, IgG до β_2 -глікопротеїну 1 через 2,5 міс був у межах норми. В гострому періоді захворювання ці дослідження не проводили. Гомоцистеїн, як чинник ризику церебрального венозного тромбозу, не був підвищений і становив 13,5 μ моль/л [9].

У наведеному клінічному випадку відсутність у хворого ішемічних змін головного мозку, яка часто притаманна церебральному венозному тромбозу, пов'язана з тромбозом недомінантного поперечного дурального синусу, достатнім розвитком колатеральних дренажних вен лівої півкулі, своєчасною діагностикою та невідкладним наданням ефективного лікування. На фоні терапії у хворого відновився кровотік в уражених твердотканевих синусах, нормалізувався рівень D-димеру, фібриногену, функція окорухових нервів.

Дана стаття привертає увагу до можливості розвитку мозкового венозного тромбозу у пацієнтів з COVID-19, у яких раптово виникли головний біль, енцефалопатія чи неврологічний дефіцит.

Висновки

1. COVID-19 часто супроводжується гіперкоагуляцією та тромботичними ускладненнями.

2. Церебральний венозний тромбоз дуральних синусів асоційований з коронавірусною інфекцією є гострим та невідкладним станом, потребує високої настороженості лікарів, які ведуть пацієнтів з COVID-19, неврологів, нейрохірургів з метою своєчасного встановлення діагнозу, невідкладного призначення антикоагулянтної терапії у ефективних дозах, вирішення подальшої тактики ведення пацієнта.

3. Справжня частота церебрального венозного тромбозу синусів серед інфікованих SARS-CoV-2 недооцінена. Важливо, що раптовий початок інтенсивного головного болю з новими нехарактерними раніше властивостями є неспецифічним, проте кардинальним симптомом тромбозу венозних синусів головного мозку, що повинне насторожувати кожного фахівця, який спостерігає хворих з коронавірусною хворобою.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Список використаної літератури

1. Abouhashem S., Eldawoody H., Taha M. M. Cerebral venous sinus thrombosis in patients with COVID-19 infection. *Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced techniques and case management*. 2021. No. 24. P. 1091–1100. <https://doi.org/10.1016/j.inat.2021.101091>
2. Al-Mufti F., Amuluru K., Sahni R. Cerebral Venous Thrombosis in COVID-19: A New York Metropolitan Cohort Study. *American journal of neuroradiology*. 2021. Vol. 42, No. 7. P. 1196–1200. <https://doi.org/10.3174/ajnr.A7134>
3. Baldini T., Asioli G., Romoli M. Cerebral venous thrombosis and severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 infection: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Neurology*. 2021. No. 10. P. 1–13. <https://doi.org/10.1111/ene.14727>
4. Case definition for coronavirus disease 2019 (COVID-19) as of 29 May 2020: European centre for disease prevention and control (ECDC). 2020. <https://www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19/surveillance/case-definition> (дата звернення: 17.08.2021). <https://doi.org/10.1111/jth.14994>
5. Devreese K., Linskens E. A., Benoit D. Antiphospholipid antibodies in patients with COVID-19: a relevant observation? *Journal of thrombosis and haemostasis*. 2020. Vol. 18, No. 9. P. 2191–2201. <https://doi.org/10.1111/jth.14994>
6. Ghosh R., Roy D., Mandal A. Cerebral venous thrombosis in COVID-19 *Diabetes&Metabolic Syndrome: Clinical Research&Reviews*. 2021. Vol. 15, No. 3. P. 1039–1045. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.04.026>
7. Hughes C., Nichols T., Pike M. Cerebral venous sinus thrombosis as a presentation of COVID-19. *European journal of case reports in internal medicine*. 2020. Vol. 7, No. 5. 001691. https://doi.org/10.12890/2020_001691

8. Jose R. J., Manuel A. COVID-19 cytokine storm: the interplay between inflammation and coagulation. *The Lancet. Respiratory medicine*. 2020. Vol. 8, No. 6. P. 46–47. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(20\)30216-2](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30216-2)
9. Kalita J., Singh V. K., Misra, U. K. A study of hyperhomocysteinemia in cerebral venous sinus thrombosis. *The Indian journal of medical research*. 2020. Vol. 152, No. 6. P. 584–594. https://doi.org/10.4103/ijmr.IJMR_2125_18
10. Katz J. M., Libman R. B., Wang J. J. Cerebrovascular complications of COVID-19. *Stroke*. 2020. Vol. 51, No. 9. P. 227–231. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.031265>
11. Klok F. A., Kruip M., van der Meer N. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. *Thrombosis research*. 2020. No. 191. P. 145–147. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.04.013>
12. Liu J., Liu Y., Xiang P. Neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts critical illness patients with 2019 coronavirus disease in the early stage. *Journal of translational medicine*. 2020. Vol. 18, No. 1. P. 206. <https://doi.org/10.1186/s12967-020-02374-0>
13. Lodigiani C., Iapichino G., Carenzo L. Venous and arterial thromboembolic complications in COVID-19 patients admitted to an academic hospital in Milan, Italy. *Thrombosis research*. 2020. No. 191. P. 9–14. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.04.024>
14. McElveen W. Cerebral Venous Thrombosis. 2018. <https://emedicine.medscape.com/article/1162804-overview#a5> (дата звернення: 17.08.2021).
15. Piazza G., Campia U., Hurwitz S. Registry of arterial and venous thromboembolic complications in patients with COVID-19. *Journal of the American College of Cardiology*. 2020. Vol. 76, No. 18. P. 2060–2072. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.08.070>
16. Sellner J. Of mice and men: COVID-19 challenges translational neuroscience. *European journal of neurology*. 2020. Vol. 27, No. 9. P. 1762–1763. <https://doi.org/10.1111/ene.14278>
17. Sitanggang P. A., Tini K., Susilawathi N. M. Case reports of cerebral sinus venous thrombosis in COVID-19 patients. *Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg*. 2021. Vol. 57, No. 1. P. 83. <https://doi.org/10.1186/s41983-021-00335-y>
18. Thompson A., Morgan C., Smith P. Cerebral venous sinus thrombosis associated with COVID-19. *Practical neurology*. 2021. No. 21. P. 75–76. <https://doi.org/10.1136/practneurol-2020-002678>
19. Tu M. T., Goh C., Tan Y. K. Cerebral Venous Thrombosis in Patients with COVID-19 Infection: a Case Series and Systematic Review. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*. 2020. Vol. 29, No. 12. 1053791. <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105379>

References

1. Abouhashem, S., Eldawoody, H. & Taha, M. M. (2021). Cerebral venous sinus thrombosis in patients with COVID-19 infection. *Interdisciplinary neurosurgery: Advanced techniques and case management*, 24, 1091–1100. <https://doi.org/10.1016/j.inat.2021.101091>
2. Al-Mufti, F., Amuluru, K., Sahni, R., Bekelis, K., Karimi, R., Ogulnick, J., ... Gandhi, C. (2021). Cerebral Venous Thrombosis in COVID-19: A New York Metropolitan Cohort Study. *American journal of neuroradiology*, 42(7), 1196–1200. <https://doi.org/10.3174/ajnr.A7134>
3. Baldini, T., Asioli, G. M., Romoli, M., Carvalho Dias, M., Schulte, E. C., Hauer, L., ... Zini, A. (2021). Cerebral venous thrombosis and severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 infection: A systematic review and meta-analysis. *European journal of neurology*. <https://doi.org/10.1111/ene.14727>
4. Case definition for coronavirus disease 2019 (COVID-19) as of 29 may 2020: European centre for disease prevention and control (ECDC). (2020). <https://www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19/surveillance/case-definition>
5. Devreese, K., Linskens, E. A., Benoit, D. & Peperstraete, H. (2020). Antiphospholipid antibodies in patients with COVID-19: A relevant observation? *Journal of thrombosis and haemostasis*, 18(9), 2191–2201. <https://doi.org/10.1111/jth.14994>
6. Ghosh, R., Roy, D., Mandal, A., Pal, S. K., Chandra Swaika, B., Naga, D., ... Benito-León, J. (2021). Cerebral venous thrombosis in COVID-19. *Diabetes & metabolic syndrome*, 15(3), 1039–1045. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.04.026>
7. Hughes, C., Nichols, T., Pike, M., Subbe, C. & Elghenzai, S. (2020). Cerebral Venous Sinus Thrombosis as a Presentation of COVID-19. *European journal of case reports in internal medicine*, 7(5). https://doi.org/10.12890/2020_001691
8. Jose, R. J. & Manuel, A. (2020). COVID-19 cytokine storm: the interplay between inflammation and coagulation. *The Lancet. Respiratory medicine*, 8(6), e46–e47. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(20\)30216-2](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30216-2)
9. Kalita, J., Singh, V. K. & Misra, U. K. (2020). A study of hyperhomocysteinemia in cerebral venous sinus thrombosis. *The Indian journal of medical research*, 152(6), 584–594. https://doi.org/10.4103/ijmr.IJMR_2125_18
10. Katz, J. M., Libman, R. B., Wang, J. J., Sanelli, P., Filippi, C. G., Gribko, M., ... Azhar, S. (2020). Cerebrovascular Complications of COVID-19. *Stroke*, 51(9), e227–e231. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.031265>
11. Klok, F. A., Kruip, M., van der Meer, N., Arbous, M. S., Gommers, D., Kant, K. M., ... Endeman, H. (2020). Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. *Thrombosis research*, 191, 145–147. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.04.013>

12. Liu, J., Liu, Y., Xiang, P., Pu, L., Xiong, H., Li, C., ... Wang, X. (2020). Neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts critical illness patients with 2019 coronavirus disease in the early stage. *Journal of translational medicine*, 18(1), 206. <https://doi.org/10.1186/s12967-020-02374-0>
 13. Lodigiani, C., Iapichino, G., Carenzo, L., Cecconi, M., Ferrazzi, P., Sebastian, T., ... Humanitas COVID-19 Task Force (2020). Venous and arterial thromboembolic complications in COVID-19 patients admitted to an academic hospital in Milan, Italy. *Thrombosis research*, 191, 9–14. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.04.024>
 14. McElveen W. (2018). Cerebral Venous Thrombosis. Available at: <https://emedicine.medscape.com/article/1162804-overview#a5>
 15. Piazza, G., Campia, U., Hurwitz, S., Snyder, J. E., Rizzo, S. M., Pfeferman, M. B., ... Goldhaber, S. Z. (2020). Registry of Arterial and Venous Thromboembolic Complications in Patients With COVID-19. *Journal of the American College of Cardiology*, 76(18), 2060–2072. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.08.070>
 16. Sellner, J. (2020). Of mice and men: COVID-19 challenges translational neuroscience. *European journal of neurology*, 27(9), 1762–1763. <https://doi.org/10.1111/ene.14278>
 17. Sitanggang, P. A., Tini, K., Susilawathi, N. M., Wijayanti, I., Dewi, P. U. & Samatra, D. (2021). Case reports of cerebral sinus venous thrombosis in COVID-19 patients. *The Egyptian journal of neurology, psychiatry and neurosurgery*, 57(1), 83. <https://doi.org/10.1186/s41983-021-00335-y>
 18. Thompson, A., Morgan, C., Smith, P., Jones, C., Ball, H., Coulthard, E. J., ... Rice, C. M. (2020). Cerebral venous sinus thrombosis associated with COVID-19. *Practical neurology*. <https://doi.org/10.1136/practneurol-2020-002678>
 19. Tu, T. M., Goh, C., Tan, Y. K., Leow, A. S., Pang, Y. Z., Chien, J., ... Yeo, L. L. (2020). Cerebral Venous Thrombosis in Patients with COVID-19 Infection: a Case Series and Systematic Review. *Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association*, 29(12). <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105379>
-

I. BOHDAN, A. BOHDAN

Military Medical Clinical Center of Western Region, Lviv, Ukraine

Cerebral venous sinus thrombosis in a patient with severe COVID-19: clinical case

Summary

Background. *Despite the current pandemic of coronavirus disease of 2019 (COVID-19) is more frequently associated with acute respiratory distress syndrome, during the global fight against this infection, there is an increasing evidence of*

multisystem involvement, including a high risk of thrombotic events. In contrast to arterial thrombosis, cerebral venous thrombosis is a rare complication. However, it causes a significant challenge in early diagnosis and treatment as well. This study aimed to demonstrate and analyze a clinical case of cerebral venous sinus thrombosis in a patient with severe COVID-19.

Purpose. *Increase the awareness of cerebral venous sinus thrombosis in patients with COVID-19.*

Results. *We present a clinical case of a patient with sudden onset headache, abductor nerve palsy, orbital soft tissues edema, who after initially negative test for coronavirus, was diagnosed with cerebral venous sinus thrombosis and COVID-19.*

Conclusions.

1. COVID-19 is often accompanied by hypercoagulation and thromboembolic complications.

2. Cerebral venous sinus thrombosis associated with coronavirus infection is an acute and urgent condition. It requires high awareness among physicians managing patients with COVID-19, neurologists, neurosurgeons in order to immediately initiate anticoagulant therapy in effective doses.

3. The real incidence of cerebral venous sinus thrombosis among SARS-CoV-2 infected patients remains underestimated. It is important that sudden onset headache with new features is a nonspecific but crucial symptom of cerebral venous sinus thrombosis and has to alert every specialist who observes patients with coronavirus disease.

Key words: *cerebral venous sinus thrombosis, cerebral venous thrombosis, COVID-19, coronavirus disease.*

И. С. БОГДАН, А. И. БОГДАН

Военно-медицинский клинический центр Западного региона, г. Львов, Украина

Тромбоз венозных синусов головного мозга вследствие осложненного течения COVID-19: клинический случай

Резюме

Актуальность. *Несмотря на то, что современная эпидемия коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) чаще всего ассоциируется с острым респираторным дистресс-синдромом, за время мировой борьбы с данной инфекцией приобретены доказательства мультисистемного поражения организма, в частности зафиксирован высокий риск тромботических событий. В противоположность артериальным тромбозам, венозные тромбозы центральной нервной системы являются редким осложнением, однако составляют значительную проблему не только в эффективном лечении, но и в диагностике. В данной статье мы демонстрируем и анализируем клинический случай венозного тромбоза дуральных синусов у пациента с тяжелым течением COVID-19.*

Цель. *Повысить настороженность относительно возникновения церебрального венозного тромбоза дуральных синусов при ведении пациентов с COVID-19.*

Результаты и их обсуждение. Приведены данные пациента с внезапным возникновением цефалгического синдрома, пареза отводящего нерва с отеком мягких тканей орбиты, у которого после первично негативного теста на коронавирус диагностирован тромбоз венозных синусов головного мозга на фоне COVID-19.

Выводы

1. COVID-19 часто сопровождается гиперкоагуляцией и тромботическими осложнениями.

2. Церебральный венозный тромбоз дуральных синусов ассоциирован с коронавирусной инфекцией и является острым и неотложным состоянием. Требуется высокой настороженности врачей, которые ведут пациентов с COVID-19, неврологов, нейрохирургов с целью безотлагательного назначения антикоагулянтной терапии в эффективных дозах, решения дальнейшей тактики ведения пациента.

3. Настоящая частота церебрального венозного тромбоза синусов среди инфицированных SARS-CoV-2 недооценена. Важно, что внезапное возникновение интенсивной головной боли с новыми нехарактерными ранее свойствами является неспецифическим, однако кардинальным симптомом тромбоза венозных синусов мозга, должно настораживать каждого специалиста, который наблюдает больных с коронавирусной болезнью.

Ключевые слова: тромбоз венозных синусов головного мозга, церебральный венозный тромбоз дуральных синусов, церебральный венозный тромбоз, COVID-19, коронавирусная болезнь.

Стаття надійшла до редакції 01.09.2021