DOI: 10.32751/2310-4910-2021-28-2-19

УДК: 616.98:616.24-002.153-008.4

**М. А. СТУПНИЦЬКИЙ, Ю. Є. СКУРАТИВСЬКИЙ,
А. І. РОДЗОНЯК, В. М. ДЕТКОВ, І. М. ОСІЙК**

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Застосування мультигазового моніторингу для оцінки функції зовнішнього дихання на прикладі тяжкої COVID-19 пневмонії

Численні закордонні протоколи рекомендують вибір певних неінвазивних та інвазивних методів оксигенотерапії залежно від індексу оксигенації. Визначення даного індексу передбачає, окрім аналізу газового складу крові, значення інспіраторної фракції кисню, яке складно точно оцінити у пацієнтів, які перебувають не на штучній вентиляції легень, а тим більше за умов застосування різних способів проведення оксигенотерапії.

У статті запропоновано спосіб оцінки індексу оксигенації за допомогою визначення інспіраторної фракції кисню з використанням монітора стану пацієнта з блоком мультигазового моніторингу. Продемонстровано ефективність застосування даного методу на клінічному прикладі динамічного спостереження за функцією зовнішнього дихання у пацієнта, який перебував на лікуванні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії клініки хірургії серця та магістральних судин з діагнозом: Коронавірусна хвороба COVID-19, двобічна полісегментарна пневмонія тяжкого перебігу, гострий респіраторний дистрес-синдром тяжкого ступеня, легенева недостатність III ст. Визначено, що моніторинг стану функції зовнішнього дихання є непростим завданням за умов самостійного дихання пацієнта, адже багато чинників впливають на склад киснево-повітряної суміші, що вдихається, а саме – глибина та частота дихання, конституція пацієнта, потік зволоженого кисню, пристрій для кисневої терапії (носові канюлі, лицева маска з або без резервуару), застосування прон-позиції тощо. Застосування мультигазового моніторингу для визначення інспіраторної фракції кисню дає можливість точно оцінити індекс оксигенації на фоні самостійного дихання, адже як видно з наведеного клінічного випадку спостерігається розбіжність між динамікою картини комп'ютерної томографії, пульсоксиметричним визначенням насичення гемоглобіну киснем, газовим складом крові, фізикальними показниками функції зовнішнього дихання та індексом оксигенації на фоні поступового зменшення потоку зволоженого кисню.

Ключові слова: COVID-19, гострий респіраторний дистрес-синдром, мультигазовий моніторинг, оксигенотерапія.

За період від першого підтвердженого випадку (01.04.2020–30.09.2020) у Збройних Силах України було виявлено 2825 випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19). У середньому за добу під час «суворого» карантину фіксувалося 5 випадків захворювання та 30 під час адаптивного карантину [1].

Наявні дані свідчать про значний ризик смерті пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19, проте чітких предикторів прогнозу, а також тяжкості перебігу даного захворювання на сьогодні остаточно не розроблено [2]. Під час пандемії COVID-19 рекомендації Surviving Sepsis Campaign-COVID-19, а також Американської торакальної спільноти запропонували надавати допомогу пацієнтам за допомогою ARDSnet протоколу. Однак було помічено, що гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС), що ускладнює перебіг пневмонії, яку спричиняє SARS-CoV-2, не є типовим [6, 7]. Ще одним важливим аспектом проблеми COVID-19 асоційованої пневмонії є висока частота виникнення фіброзних змін у легенях у реконвалесцентів коронавірусної хвороби [4].

Численні закордонні протоколи рекомендують вибір певних неінвазивних та інвазивних методів оксигенотерапії залежно від індексу оксигенації ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) [3]. Визначення даного індексу передбачає окрім аналізу газового складу крові, значення інспіраторної фракції кисню, яке складно точно оцінити у пацієнтів, які перебувають не на штучній вентиляції легень, а тим більше за умов застосування різних способів проведення оксигенотерапії (носові канюлі, лицеві маски з та без резервуара тощо).

Опис клінічного випадку. Пацієнт 65 років перебував на лікуванні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії для пацієнтів на коронавірусну хворобу з діагнозом:

Коронавірусна хвороба COVID-19, двобічна полісегментарна пневмонія тяжкого перебігу, ГРДС тяжкого ступеня, легенева недостатність III ст., двобічний пневмофіброз, бульозна емфізема в шостому та десятому сегментах нижньої частки правої легені.

ІХС: атеросклеротичний кардіосклероз, СН-I ст. Атеросклероз аорти. Гіпертонічна хвороба II ст., ступінь 1, гіпертензивне серце, ризик високий.

Цукровий діабет 2-го типу, середнього ступеня важкості, субкомпенсований.

Хронічна залізодефіцитна анемія легкого ступеня.

Змішана енцефалопатія II стадії з лівобічною пірамідною недостатністю, вестибулярними розладами.

На 30-ту добу захворювання у зв'язку з отриманням негативного результату повторного ПЛР-тесту на РНК вірусу SARS-Cov-2, пацієнт був переведений до відділення реанімації та інтенсивної терапії клініки хірургії серця та магістральних судин.

Загальний стан на момент переводу тяжкий. В свідомості, скарги на виражену нестачу повітря, що посилюється у разі незначного фізичного навантаження, розмови та прийому їжі. Частота дихальних рухів до 28–34 за 1 хв. Дихання з інгаляцією зволоженого кисню з потоком до 8–10 л/хв через лицеву маску з резервуаром, насичення крові киснем (SpO_2) 68–93%, парціальна напруга кисню (PaO_2) 87 мм рт. ст., парціальна напруга вуглекислого газу ($PaCO_2$) – 41,1 мм рт. ст. Аускультативно дихання жорстке з бронхіальним відтінком, різко ослаблене у задньонижніх відділах легень з крепітацією. При комп'ютерно-томографічному (КТ) обстеженні органів грудної клітки (34-та доба захворювання) легеневі поля тотально неоднорідно ущільнені за типом матового скла, виражені фіброзні зміни обох легневих полів. Визначається була в S10 правої легені. Корені ущільнені, розширені. Трахея і бронхи не деформовані, хід сегментарних бронхів з лінійними фіброзними тяжами (рис. 1).

Рис. 1. КТ органів грудної клітки у пацієнта на 34-ту добу захворювання

З метою точного визначення інспіраторної фракції кисню застосували монітор пацієнта з блоком мультигазового моніторингу. Лінію відбору проби газу було введено під лицеву маску, через яку подавався зволожений кисень. Отримано значення фракції кисню на вдиху (FiO_2) 90%, таким чином індекс PaO_2/FiO_2 становив 96,6.

Протягом лікування загальний стан пацієнта покращився, суб'єктивно покращилось самопочуття, зменшилась вираженість задишки, збільшилась толерантність до фізичного навантаження, покращився апетит, стабілізувались показники газообміну за типом хронічної гіперкапнії, при аускультатії зникла крепітація. На контрольному КТ-обстеженні органів грудної клітки (55-та доба) негативна динаміка: в обох легенях практично на всьому протязі павутиноподібне зниження пневматизації легеневої тканини за типом матового скла з наявністю зменшення зон консолидації, прогресуванням фіброзу, з формуванням нової повітряної порожнини в правій легені субплеврально в S6 розміром 30×50 мм. Повітряна порожнина в S10 збільшилася в розмірах до 40×23 мм (рис. 2).

Рис. 2. КТ органів грудної клітки у пацієнта на 55-ту добу захворювання

Клінічно зберігалась задишка до 26–30 дихальних рухів за 1 хв, інгаляція зволоженого кисню з потоком до 5–6 л/хв через лицеву маску з резервуаром, SpO₂ 88–95%, PaO₂ 71 мм рт. ст., PaCO₂ – 52,6 мм рт. ст. Визначено FiO₂ за допомогою вищеописаного способу, що становило 60 %. Таким чином, PaO₂/FiO₂ становив 118.

Загальний стан пацієнта поступово стабілізувався на фоні інтенсивної терапії, зменшувалась киснева залежність, зростала толерантність до фізичного навантаження. На 61-шу добу захворювання пацієнт переведений у пульмонологічне відділення для подальшого лікування. Клінічно

зберігалась задишка до 24 дихальних рухів за 1 хв на фоні інгаляції зволоженого кисню 6 л/хв через лицеву маску з резервуаром, що відповідало показнику FiO_2 46%, визначеного за допомогою запропонованого методу. За таких умов дещо нормалізувались показники функції зовнішнього дихання: SpO_2 92%, PaO_2 65 мм рт. ст., PaCO_2 49,2 мм рт. ст., $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ – 142.

Обговорення

У разі госпіталізації пацієнта у відділення інтенсивної терапії з проявами ГРДС в першу чергу постає питання щодо необхідності забезпечення достатньої оксигенації та вентиляції мінімально інвазивними доступними методами. Проблема моніторингу функціонального стану цих життєво важливих функцій дихальної системи залишається постійно, оскільки такі пацієнти весь час перебувають на межі декомпенсації напруженої функції зовнішнього дихання і часто потребують повторної оцінки визначення потреби переведення на інвазивну штучну вентиляцію легень. Різноманітність пристроїв для забезпечення оксигенації неінвазивним способом дещо ускладнюють моніторинг функції зовнішнього дихання, а саме альвеолярно-артеріального градієнта за киснем. З іншого боку, різні закономірності перебігу COVID-19, виявлені під час ранньої презентації патології, залежать від взаємодії трьох факторів: тяжкості інфекції, реакції пацієнта, фізіологічного резерву та супутніх захворювань; вентиляційної реакції на гіпоксемію; часу, що минув від початку захворювання та спостереженням у лікувальному закладі [5].

Попри дуже низькі показники індексу оксигенації, пацієнт, про якого йдеться у клінічному випадку, добре відповідав на лікування, в тому числі й на проведення оксигенації вищеописаним методом. Протягом усього періоду перебування в стаціонарі не було помічено явищ гіпоксичної енцефалопатії, не розвивався респіраторний ацидоз за даними результатів аналізів газового складу артеріальної крові, що не давало клінічних підстав для переведення пацієнта на штучну вентиляцію легень і підтверджувало атиповий перебіг ГРДС у цього хворого.

Висновки

Моніторинг стану функції зовнішнього дихання є непростим завданням за умов самостійного дихання пацієнта, адже на склад киснево-повітряної суміші впливають багато чинників, що вдихаються, а саме – глибина та частота дихання, конституція пацієнта, потік зволоженого кисню, пристрій для кисневої терапії (носові канюлі, лицева маска з або без резервуара), застосування прон-позиції тощо. Застосування мультигазового моніторингу для визначення інспіраторної фракції кисню дає

можливість точно оцінити індекс оксигенації на фоні самостійного дихання, адже можуть спостерігатися розбіжності між динамікою КТ-картини, пульсоксиметричним визначенням насичення гемоглобіну киснем, газовим складом крові, фізикальними показниками функції зовнішнього дихання та індексом оксигенації на фоні поступового зменшення потоку зволоженого кисню.

Перспективи подальших досліджень. Майбутні дослідження планується спрямувати на випробування ефективності вищеописаного методу визначення інспіраторної фракції кисню у разі застосування інших методів оксигенотерапії та за умов інших патологічних станів дихальної системи.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Список використаної літератури

1. Савицький В. Л., Кожокару А. А., Огороднійчук І. В., Івачевська Н. С., Доброштан Д. І., Нарожнов В. В., Якимець В. М. Гостра респіраторна хвороба, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2 у Збройних Силах України. *Український журнал військової медицини*. 2020. № 1(3). С. 45–51.
2. Сидорова Н. М., Казмірчук А. П., Сидорова Л. Л. Методи математичного прогнозування в медико-біологічних дослідженнях та їх теоретичні можливості в прогнозуванні перебігу COVID-19. *Сучасні аспекти військової медицини*. 2020. № 27(1). С. 213–227.
3. Фещенко Ю. І., Дзюблик О. Я., Дзюблик Я. О. та ін. Негоспітальна пневмонія, асоційована з COVID-19: погляди на лікування. *Український пульмонологічний журнал*. 2020. № 2. С. 5–12.
4. Фещенко Ю. І., Голубовська О. А., Дзюблик О. Я. та ін. Особливості ураження легень при COVID-19. *Український пульмонологічний журнал*. 2021. № 29(1). С. 5–14.
5. Gattinoni L., Chiumello D., Caironi P. et al. COVID-19 pneumonia: different respiratory treatments for different phenotypes? *Intensive Care Med*. 2020. 46(6). P. 1099–1102.
6. Marini J. J., Gattinoni L. Management of COVID-19 Respiratory Distress. *JAMA*. 2020. 323(22). P. 2329–2330.
7. Tsolaki V., Zakynthinos G. E., Makris D. The ARDSnet protocol may be detrimental in COVID-19. *Crit. Care*. 2020. 24(1). P. 4–5.

References

1. Savytskyi, V. L., Kozhokaru, A. A., Ohorodniychuk, I. V., Ivachevska, N. S., Dobroshtan, D. I., Narozhnov, V. V. & Yakymets, V. M. (2020). Hostra respiratorna khvoroba, sprychynena koronavirusom SARS-CoV-2 u Zbroinykh Sylakh Ukrainy. *Ukrainskyi zhurnal viiskovoi medytsyny*, 1 (3), 45–51. [in Ukrainian].
2. Sydorova, N. M., Kazmirschuk, A. P. & Sydorova, L. L. (2020). Metody matematychnoho prohnouzuvannya v medyko-biologichnykh doslidzhenniakh ta yikh teoretychni mozhyvosti v prohnouzuvanni perebihu SOVID-19. *Suchasni aspekty viiskovoi medytsyny*, 27 (1), 213–227. [in Ukrainian].
3. Feshchenko, Y. I., Dziublyk, O. Y., Dziublyk, Y. O., Pylypenko, M. M. & Bororova, O. L. (2020). Nehospitalna pnevmoniiia, asotsiiiovana z COVID-19: pohliady na likuvannya. *Ukrainskyi pulmonologichnyi zhurnal*, 2, 5–12. [in Ukrainian].
4. Feshchenko, Y. I., Golubovska, O. A., Dziublyk, A. Y., Gavrysyuk, V. K., Dziublyk, Y. A. & Liskina, I. V. (2021). Osoblyvosti urazhennia lehen pry COVID-19. *Ukrainskyi pulmonologichnyi zhurnal*, 29 (1) № 1, 5–14. [in Ukrainian].
5. Gattinoni, L., Chiumello, D., Caironi, P., Busana, M., Romitti, F., Brazzi, L. & Camporota, L. (2020). COVID-19 pneumonia: different respiratory treatments for different phenotypes? *Intensive Care Med.*, 46(6), 1099–1102.
6. Marini, J. J., Gattinoni, L. (2020). Management of COVID-19 Respiratory Distress. *JAMA*, 323(22), 2329–2330.
7. Tsolaki, V., Zakynthinos, G. E. & Makris, D. (2020). The ARDSnet protocol may be detrimental in COVID-19. *Crit. Care*, 24(1), 4–5.

**M. A. STUPNYTSKYI, YU. YE. SKURATIVSKYI,
A. I. RODZONIAK, V. M. DETKOV, I. M. OSIYIK**

Military Medical Clinical Center Of The Western Region, Lviv, Ukraine

Application of the Multi-Gas monitoring for the respiratory function evaluation on example of severe COVID-19 pneumonia

Summary

Numerous foreign protocols recommend choice of certain non-invasive and invasive oxygen therapy methods in accordance with the oxygenation index. In addition to the analysis of blood gas composition, determination of oxygenation index involves estimation of the oxygen's inspiratory fraction value, which is difficult to assess accurately in patients who are not on mechanical lung ventilation, moreover, if different

methods of oxygen therapy are used. The oxygenation index estimation method by determining the inspiratory fraction of oxygen using bedside vital sign monitor with a multi-gas monitoring unit was proposed in this article. The effectiveness of this method was demonstrated on example of clinical case of patient treated in Intensive Care Department of the Cardiovascular Surgery Clinic with diagnosis: coronavirus disease COVID-19, bilateral polysegmental severe pneumonia, severe distress syndrome, pulmonary insufficiency of the third degree. It was determined that monitoring of the respiratory function is a difficult task under conditions of spontaneous breathing, because many factors affect the composition of the inhaled oxygen-air mixture, namely – depth and frequency of breathing, patient's constitution, oxygen flow, the device for oxygen therapy (nasal cannulas, face mask with or without reservoir), application of prone position, etc. The use of multi-gas monitoring for determination of the inspiratory fraction of oxygen gives possibility accurately determine the oxygenation index in conditions of spontaneous breathing, because there is a discrepancy between the dynamics of CT-scans, pulse oximetric determination of hemoglobin saturation, results of blood gas analyses and physical respiratory signs in conditions of a gradual decrease in the humidified oxygen flow, as can be seen from clinical case.

Key words: COVID-19, acute respiratory distress syndrome, multi-gas monitoring, oxygen therapy.

**М. А. СТУПНИЦКИЙ, Ю. Е. СКУРАТОВСКИЙ,
А. И. РОДЗОНЯК, В. М. ДЕТКОВ, И. М. ОСИНИК**

Военно-медицинский клинический центр Западного региона, г. Львов, Украина

Использование мультигазового мониторинга для оценки функции внешнего дыхания на примере тяжелой COVID-19 пневмонии

Резюме

Многочисленные зарубежные протоколы рекомендуют выбор определенных неинвазивных и инвазивных методов оксигенотерапии в зависимости от индекса оксигенации. Определение данного индекса предполагает кроме анализа газового состава крови, значение инспираторной фракции кислорода, которое сложно точно оценить у пациентов, находящихся не на искусственной вентиляции легких, а тем более в условиях применения различных способов проведения оксигенотерапии. В статье предложен способ оценки индекса оксигенации с помощью определения инспираторной фракции кислорода с использованием монитора состояния пациента с блоком мультигазового мониторинга. Продемонстрирована эффективность применения данного метода на клиническом примере динамического наблюдения за функцией внешнего дыхания у пациента, находившегося на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии клиники хирургии сердца и магистральных сосудов с диагнозом: Коронавирусная болезнь

COVID-19, двусторонняя полисегментарная тяжелая пневмония, острый респираторный дистресс-синдром тяжелой степени, легочная недостаточность III ст. Определено, что мониторинг состояния функции внешнего дыхания является непростой задачей в условиях самостоятельного дыхания пациента, поскольку многие факторы влияют на состав вдыхаемой кислородно-воздушной смеси, а именно – глубина и частота дыхания, конституция пациента, поток увлажненного кислорода, устройство для кислородной терапии (носовые канюли, лицевая маска с или без резервуара), применение прона-позиции и тому подобное. Применение мультигазового мониторинга для определения инспираторной фракции кислорода дает возможность точно оценить индекс оксигенации на фоне самостоятельного дыхания, ведь как видно из приведенного клинического случая, наблюдается расхождение между динамикой картины компьютерной томографии, пульсоксиметрическим определением насыщения гемоглобина кислородом, газовым составом крови, физикальными показателями функции внешнего дыхания и индексом оксигенации на фоне постепенного уменьшения потока увлажненного кислорода.

Ключевые слова: *COVID-19, острый респираторный дистресс-синдром, мультигазовый мониторинг, оксигенотерапия.*

Стаття надійшла до редакції 15.09.2021