DOI: 10.32751/2310-4910-2021-28-1-12

УДК 616.33:616.342

Г. В. ОСЬОДЛО¹, В. В. ДЯЧЕНКО², Ю. Я. КОТИК¹

¹ – Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

² – Командування Медичних Сил Збройних Сил України, м. Київ, Україна

Аналіз десятирічної динаміки показників госпіталізації військовослужбовців до клінічних центрів Міністерства оборони України з приводу виразкової хвороби

Мета. Вивчити десятирічну динаміку показників госпіталізації з приводу виразкової хвороби гастродуоденальної зони військовослужбовців у клінічних центрах регіонів Міністерства оборони України.

Матеріали та методи. Проаналізовано 50 звітних документів (форма 2МЕД) клінічних центрів регіонів Міністерства оборони України за період 2009–2018 рр.

Результати та висновки. Встановлено, що за десятирічний період у клінічних центрах Міністерства Оборони України зареєстровано 346 991 випадків захворювань, з яких 2,68% – виразка шлунку та 20,51% – виразка дванадцятипалої кишки. Проведений аналіз трендів частки госпіталізованих хворих з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони впродовж 2009–2018 рр. продемонстрував відсутність суттєвих їх змін у структурі госпіталізації до Національного військово-медичного клінічного центру (ВМКЦ) «Головний військовий клінічний госпіталь» та ВМКЦ Південного регіону – достовірність апроксимації розрахованих трендів значно нижча 0,9, що свідчить про ненадійність розрахованих трендів. Такі дані можуть опосередковано відображати стабільну ситуацію з цими захворюваннями в регіонах, які обслуговують ці лікувальні заклади.

Аналіз трендів частки госпіталізованих свідчить про зростання впродовж 10 років кількості госпіталізацій з приводу виразкової хвороби шлунку в деяких регіонах: у ВМКЦ Північного регіону в загальній групі ($R^2=0,9638$) без суттєвої динаміки госпіталізованих постійної служби та військовослужбовців строкової служби окремо та у ВМКЦ Західного регіону в групі військовослужбовців строкової служби ($R^2=0,9152$).

Аналіз трендів частки госпіталізованих продемонстрував суттєве зниження кількості госпіталізацій з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в ВМКЦ Західного регіону (в загальній групі – $R^2=0,9198$, в підгрупі військовослужбовців постійного складу – $R^2=0,9245$, в підгрупі військовослужбовців строкової служби – $R^2=0,9257$) та ВМКЦ Центрального регіону (в загальній групі – $R^2=0,9412$ за рахунок підгрупи військовослужбовців постійного складу $R^2=0,9289$).

Нижчі показники частки госпіталізованих з приводу виразкової хвороби військовослужбовців строкової служби порівняно з військовослужбовцями постійного складу можна пояснити обмеженням терміном військової служби цього контингенту, жорсткими критеріями медичного огляду при відборі кандидатів на строкову військову службу та відсутністю їх залучення до бойових дій.

Ключові слова: виразкова хвороба, гастродуоденальна зона, динаміка госпіталізацій, військовослужбовці.

Захворювання органів травлення займають одне з ключових місць серед загальної структури захворювань та посідають третє місце за поширеністю серед населення України та восьме – у структурі захворюваності [7]. Найбільшу частку у структурі хвороб органів травлення складають кислотозалежні захворювання – гастроезофагеальна хвороба та виразкова хвороба гастродуоденальної зони. Їх частка в Україні складає близько 13%. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки (ВХДПК) зустрічається в 4 рази частіше, ніж виразкова хвороба шлунку (ВХШ) [1]. Захворювання органів травлення є особливо актуальними серед військовослужбовців, з початком війни на Донбасі їх частка зросла до 45,8% серед інших захворювань внутрішніх органів [6]. Варто відмітити, що доля ерозивно-виразкових уражень езофагогастродуоденальної зони серед хвороб органів травлення в учасників антитерористичної операції зросла до 72% [3, 4].

В умовах бойових дій всі військовослужбовці піддаються впливу стресу, який є одним із ключових чинників ризику розвитку пептичної виразки гастродуоденальної зони [4]. Окрім того слід враховувати ризики, пов'язані з безконтрольним прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, незадовільним харчуванням, а також інфікуванням *H. pylori* – основним чинником розвитку ерозивно-виразкових пошкоджень гастродуоденальної зони та канцерогенного триггеру щодо розвитку раку шлунку [7].

Мета роботи – вивчити десятирічну динаміку частоти госпіталізації з приводу виразкової хвороби гастродуоденальної зони серед військовослужбовців клінічних центрів регіонів Міністерства оборони України.

Матеріали та методи

Проведено аналіз медико-статистичної звітної документації закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України (50 звітів за формою 2МЕД) за період з 2009 по 2018 рр. Проаналізовано звітні документи за вказаний період наступних закладів охорони здоров'я: Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» (НВМКЦ «ГВКГ»), військово-медичних клінічних центрів Західного (ВМКЦ ЗР), Північного (ВМКЦ ПнР), Південного (ВМКЦ ПР)

та Центрального (ВМКЦ ЦР) регіонів. Аналізували частку хворих на виразкову хворобу шлунку (ВХШ) та дванадцятипалої кишки (ВХДПК) серед госпіталізованих військовослужбовців.

Критерії включення до дослідження: діючі військовослужбовці постійного складу (офіцери та військовослужбовці за контрактом), діючі військовослужбовці строкової служби.

Критерії виключення з дослідження: військовослужбовці інших військових формувань, пенсіонери Міністерства оборони України, пацієнти за оплату.

Розрахунок частки військовослужбовців, хворих на ВХДПК та ВХШ, здійснювали за загальноприйнятими формулами. Аналізували кількість військовослужбовців, госпіталізованих з приводу цих хвороб в різних регіонах України, у тому числі військовослужбовців постійного складу (військовослужбовців за контрактом та офіцерів) і військовослужбовців строкової служби окремо.

Аналіз динаміки показників виконували шляхом оцінки побудованої лінії тренду. Тип лінії тренду обирали залежно від значення апроксимації R^2 (достовірність лінії тренду зростає при наближенні значення апроксимації R^2 до 1).

Результати та їх обговорення

Встановлено, що за звітний період з 2009 по 2018 рр. загальна кількість військовослужбовців, які перебували на лікуванні у клінічних центрах регіонів становила 346 991 осіб, з яких у НВМКЦ «ГВКГ» – 95 293, ВМКЦ ЦР – 56 170, ВМКЦ ПнР – 5 033, ВМКЦ ПР – 70 973, ВМКЦ ЗР – 74 422 пацієнтів. З приводу ВХШ було госпіталізовано 930 (2,68%) військовослужбовців, з яких 842 (2,43%) – військовослужбовці постійного складу та 88 (0,25%) – військовослужбовці строкової служби. З приводу ВХДПК зареєстровано 7 117 (20,51%) військовослужбовців, з яких 6 393 (18,42%) – військовослужбовці постійного складу та 724 (2,09%) – військовослужбовці строкової служби.

За звітний період у НВМКЦ «ГВКГ» з приводу виразкової хвороби було проліковано 1 457 військовослужбовців, з них 195 – військовослужбовці строкової служби та 1 262 – військовослужбовці постійного складу.

Дані звітів НВМКЦ «ГВКГ» свідчать про те, що в період з 2009 по 2014 рр. частка госпіталізованих з приводу ВХДПК була стабільно високою та коливалась в межах 17–21%. Стрімке зниження кількості госпіталізованих хворих відбулося в період з 2015 по 2016 роки з подальшим зростанням показників (рис. 1).

Рис. 1. Частка хворих (%) на ВХДПК серед військовослужбовців, які перебували на лікуванні у НВМКЦ «ГВКГ» у період 2009–2018 рр.

Частка військовослужбовців строкової служби з ВХДПК за період 2009–2018 рр. була відносно стабільною та коливалась в межах 0,8–3,1%. Серед військовослужбовців постійного складу динамічна крива, що показує щорічні частки хворих на ВХДПК, носила хвилюподібний характер та мала загальну тенденцію до поступового зниження, що особливо чітко спостерігалось після 2014 р. (рис. 2).

Рис. 2. Частка хворих (%) на ВХДПК серед військовослужбовців окремих категорій, які перебували на лікуванні у НВМКЦ «ГВКГ» у період 2009–2018 рр.

За аналогічний період до НВМКЦ «ГВКГ» на стаціонарне лікування з приводу ВХШ поступили 122 військовослужбовця, з них 14 – військовослужбовці строкової служби та 108 – військовослужбовці постійного складу.

Частота виявлення ВХШ серед усіх військовослужбовців, що перебували на стаціонарному лікуванні у НВМКЦ «ГВКГ» в динаміці показана на рис. 3.

Рис. 3. Частка хворих (%) на ВХШ серед військовослужбовців, які перебували на лікуванні у НВМКЦ «ГВКГ» у період 2009–2018 рр.

Частка військовослужбовців строкової служби, що знаходились на лікуванні у НВМКЦ «ГВКГ» з діагнозом ВХШ з 2009 по 2018 рр., знаходилась в межах до 0,4% та мала відносно стабільну динаміку (рис. 4).

Рис. 4. Частка хворих (%) на ВХШ серед військовослужбовців окремих категорій, які перебували на лікуванні у НВМКЦ «ГВКГ» у період 2009–2018 рр.

У ВМКЦ ПНР (м. Харків) за звітний період на стаціонарному лікуванні з приводу ВХДПК перебували 880 військовослужбовців, з них 76 – військовослужбовці строкової служби та 804 – військовослужбовці постійного складу.

У зоні відповідальності ВМКЦ ПнР найбільшу кількість військово-службовців з ВХДПК зафіксовано у 2010 р., потім відмічено поступове зниження частоти захворювання з підйомом у 2013 р., загальна тенденція має низхідний характер (рис. 5).

Рис. 5. Частка хворих (%) на ВХДПК серед військовослужбовців, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ПнР у період 2009–2018 рр.

Частка військовослужбовців строкової служби, що перебували на лікуванні у ВМКЦ ПнР з приводу ВХДПК за період 2009–2018 рр., була відносно стабільною зі схильністю до зниження. Серед військовослужбовців постійного складу доля виявлення ВХДПК також має загальну тенденцію до поступового зниження з максимальними значеннями у 2010 та 2013–14 рр. (рис. 6).

Рис. 6. Частка хворих (%) на ВХДПК серед військовослужбовців окремих категорій, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ПнР у період 2009–2018 рр.

Серед госпіталізованих військовослужбовців північного регіону за звітний період з приводу ВХШ знаходились 58 осіб, з них 4 – військовослужбовці строкової служби та 56 – військовослужбовці постійного складу. Динамічний ряд показників має ступінчастий характер із загальною тенденцією до зростання (рис. 7).

Рис. 7. Частка хворих (%) на ВХШ серед військовослужбовців, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ПнР у період 2009–2018 рр.

Розподіл частоти виявлення виразкової хвороби серед окремих категорій військовослужбовців північного регіону демонструє, що зростання загальних показників відбувається за рахунок військовослужбовців постійного складу, тоді як серед військовослужбовців строкової служби це поодинокі випадки (рис. 8).

Рис. 8. Частка хворих (%) на ВХШ серед військовослужбовців окремих категорій, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ПнР у період 2009–2018 рр.

У ВМКЦ ПР (м. Одеса) за період 2009–2018 рр. на стаціонарному лікуванні з приводу ВХДПК перебували 1 158 військовослужбовців, з них 157 – військовослужбовці строкової служби та 1 001 – військовослужбовці постійного складу.

Крива десятирічного розподілу частоти госпіталізації пацієнтів з ВХДПК мала коритоподібну форму з поступовим зниженням від 2009 р. та плавним підйомом з 2016 р. (рис. 9).

Рис. 9. Частка хворих (%) на ВХДПК серед військовослужбовців, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ПР у період 2009–2018 рр.

Серед усіх госпіталізованих військовослужбовців частка військово-службовців строкової служби з ВХДПК коливалась в межах 1,2–2,0% з кількома підвищеннями, проте мала відносно стабільний характер. Гістограма розподілу кількості випадків ВХДПК серед військовослужбовців постійного складу хвилюподібна з чергуваннями плавного зниження та підвищення показників (рис. 10).

Рис. 10. Частка хворих (%) на ВХДПК серед військовослужбовців окремих категорій, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ПР у період 2009–2018 рр.

Кількість хворих на ВХШ серед військовослужбовців, що перебували на лікуванні у ВМКЦ ПР (м. Одеса), за звітний період становила 133 особи, в тому числі 5 військовослужбовців строкової служби та 128 військовослужбовців постійного складу. Показники частки захворювань мали стабільний характер зі зниженням у 2010 р. та підвищенням з 2017 р. (рис. 11).

Рис. 11. Частка хворих (%) на ВХШ серед військовослужбовців, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ПР у період 2009–2018 рр.

Серед військовослужбовців строкової служби у ВМКЦ ПР за звітний період реєструвалась незначна кількість випадків ВХШ зі схильністю до збільшення. Серед військовослужбовців постійного складу щорічна частота виявлення ВХШ за вказаний період мала відносно стабільний характер, проте відмічається зростання показників з 2017 р. (рис. 12).

Рис. 12. Частка хворих (%) на ВХШ серед військовослужбовців окремих категорій, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ПР у період 2009–2018 рр.

У ВМКЦ ЗР (м. Львів) за період 2009–2018 рр. на стаціонарному лікуванні з приводу ВХДПК перебували 1 467 військовослужбовців, з них 1 295 військовослужбовців постійного складу та 172 – строкової служби. Графічний вигляд показників частоти виявлення ВХДПК мала загальну тенденцію до зниження, проте відмічалось її зростання у 2014–2015 рр. з подальшим поступовим зниженням (рис. 13).

Рис. 13. Частка хворих (%) на ВХДПК серед військовослужбовців, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ЗР у період 2009–2018 рр.

Серед військовослужбовців постійного складу у ВМКЦ ЗР відмічався хвилюподібний графік щорічної частоти виявлення ВХДПК з підйомом протягом 2013–2016 рр. та піком у 2014 р. (рис. 14).

Рис. 14. Частка хворих (%) на ВХДПК серед військовослужбовців окремих категорій, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ЗР у період 2009–2018 рр.

Кількість хворих, що перебували на лікуванні у ВМКЦ ЗР з приводу ВХШ у 2009–2018 рр. становила 116 осіб, з них 97 – військовослужбовці постійного складу та 19 – військовослужбовці строкової служби. Зростання частоти ВХШ спостерігається після 2013 р. з піком у 2016 р. (рис. 15).

Рис. 15. Частка хворих (%) на ВХШ серед військовослужбовців, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ЗР у період 2009–2018 рр.

Розподіл частоти реєстрування хворих з ВХШ по категоріях військовослужбовців показано на рис. 16.

Рис. 16. Частка хворих (%) на ВХШ серед військовослужбовців окремих категорій, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ЗР у період 2009–2018 рр.

За даними звітної документації ВМКЦ ЦР (м. Вінниця), у період 2009–2018 рр. на стаціонарному лікуванні з приводу ВХДПК перебували 2 157 військовослужбовців, з них 2 031 – військовослужбовці постійного складу та 126 – військовослужбовці строкової служби. Графік частоти ВХДПК має загальну тенденцію до зниження з підйомом у 2013 р. (рис. 17).

Рис. 17. Частка хворих (%) на ВХДПК серед військовослужбовців, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ЦР у період 2009–2018 рр.

Проте варто відмітити, що дані показники є набагато вищими, ніж в інших клінічних центрах. Така тенденція спостерігалась як серед військовослужбовців постійного складу, так і серед військовослужбовців строкової служби. Графічний розподіл щорічної частоти ВХДПК серед окремих категорій військовослужбовців показано на рис. 18.

Рис. 18. Частка хворих (%) на ВХШ серед військовослужбовців окремих категорій, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ЦР у період 2009–2018 рр.

За звітний період у ВМКЦ ЦР на стаціонарному лікуванні з приводу ВХШ знаходились 501 військовослужбовець, з них 455 військовослужбовців постійного складу та 46 військовослужбовців строкової служби. Відмічене стабільно високий рівень показників ВХШ зі зростанням в період 2011–2015 рр. та подальшим їх зниженням (рис. 19).

Рис. 17. Частка хворих (%) на ВХШ серед військовослужбовців, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ЦР у період 2009–2018 рр.

Зростання показників частоти виявлення ВХШ серед військовослужбовців у ВМКЦ ЦР відбувалося в основному за рахунок показників серед військовослужбовців постійного складу (рис. 20).

Рис. 20. Частка хворих (%) на ВХШ серед військовослужбовців окремих категорій, які перебували на лікуванні у ВМКЦ ЦР у період 2009–2018 рр.

Висновки

Проведений аналіз трендів частки госпіталізованих хворих з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони впродовж 2009–2018 рр. продемонстрував відсутність суттєвих їх змін у структурі госпіталізацій до НВМКЦ «ГВКГ» та ВМКЦ ПР – значення достовірності апроксимації значно нижче 0,9, що свідчить про ненадійність розрахованих трендів. Такі дані можуть опосередковано відображати стабільну ситуацію з цими захворюваннями в регіонах, які обслуговують ці лікувальні заклади.

Аналіз трендів частки госпіталізованих свідчить про зростання впродовж 10 років кількості госпіталізацій з приводу ВХШ в деяких регіонах: у ВМКЦ ПнР в загальній групі ($R^2=0,9638$) без суттєвої динаміки госпіталізованих постійної служби та військовослужбовців строкової служби окремо та у ВМКЦ ЗР в групі військовослужбовців строкової служби ($R^2=0,9152$).

Аналіз трендів частки госпіталізованих продемонстрував суттєве зниження кількості госпіталізацій з приводу ВХДПК в ВМКЦ ЗР (в загальній групі $R^2=0,9198$, в підгрупі військовослужбовців постійного складу – $R^2=0,9245$, в підгрупі військовослужбовців строкової служби – $R^2=0,9257$) та ВМКЦ ЦР (в загальній групі – $R^2=0,9412$ за рахунок підгрупи військовослужбовців постійного складу $R^2=0,9289$).

Нижчі показники частки госпіталізованих з приводу ВХШ та ВХДПК військовослужбовців строкової служби порівняно з військовослужбовцями постійного складу можна пояснити обмеженням терміном військової служби цього контингенту, жорсткими критеріями медичного огляду при відборі кандидатів на строкову військову службу та відсутністю їх залучення до бойових дій.

Перспективою подальших досліджень є розробка методів прогнозування ризику розвитку виразкових пошкоджень гастродуоденальної зони в регіонах України. Урахування динаміки захворюваності серед окремих категорій військовослужбовців дасть змогу якісніше проводити профілактику та лікування і знизити можливі негативні соціально-економічні наслідки.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Список використаної літератури

1. Князькова І. І. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки: аспекти діагностики. *Здоров'я України 21 сторіччя*. 2020. № 19(488). С. 62–64.
2. Осьодло Г. В., Шевага Г. М. Особливості перебігу та лікування кислото-залежних захворювань в учасників АТО. *Гастроентерологія*. 2015. № 23(372). С. 42–43.
3. Осьодло Г. В., Гончаров Я. П., Бесага В. В., Гамма М. О. Клініко-епідеміологічний аналіз гастроентерологічної патології в учасників АТО. *Військова медицина України*. 2015. № 15(1). С. 41–45.
4. Скрипник І. М., Гопко О. Ф. Роль стресу в патогенезі пептичної виразки гастродуоденальної зони. *Вісник проблем біології і медицини*. 2017. № 4. С. 70–73.
5. Степанов Ю. М., Скирда І. Ю., Петішко О. П. Хвороби органів травлення – актуальна проблема клінічної медицини. *Gastroenterologia*. 2019. 53(1). С. 1–6. <http://dx.doi.org/10.22141/2308-2097.53.1.2019.163450>

6. Шевчук В. І., Беляєва Н. М., Яворовенко О. Б., Куриленко І. В. Соціальні наслідки уражень внутрішніх органів в учасників антитерористичної операції. *Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика*. 2016. № 25. С. 77–81.

7. Venneman K., Huybrechts I., Gunter M. J., Vandendaele L. The epidemiology of *Helicobacter pylori* infection in Europe and the impact of lifestyle on its natural evolution toward stomach cancer after infection: A systematic review. *Helicobacter*. 2018. Vol. 23(3). P. 74–88. <https://doi.org/10.1111/hel.12483>

References

1. Kniaz'kova, I. I. (2020). Vyrzkova khvoroba shlunka ta dvanadtsiatypaloї kyshky: aspekty diahnostryky. *Zdorov'ia Ukrainy 21 storichchia*. № 19(488). S. 62–64. [In Ukrainian].

2. Os'odlo, H. V. Shevaha, H. M. (2015). Osoblyvosti perebihu ta likuvannia kyslotozaleznykh zakhvoriuvan' v uchasnykiv ATO. *Hastroenterolohiia*. № 23(372). S. 42–43. [In Ukrainian].

3. Os'odlo, H. V., Honcharov, Ya. P., Besaha, V. V., Hamma, M. O. (2015). Kliniko-epidemiolohichnyj analiz hastroenterolohichnoi patolohii v uchasnykiv ATO. *Vijs'kova medytsyna Ukrainy*. № 15(1). S. 41–45. [In Ukrainian].

4. Skrypnyk, I. M., Hopko, O. F. (2017). Rol' stresu v patohenezi peptychnoi vyrzky hastroduodenal'noi zony. *Visnyk problem biolohii i medytsyny*. № 4. S. 70–73. [In Ukrainian].

5. Stepanov, Yu. M., Skyryda, I. Yu., Petishko, O. P. (2019). Khvoroby orhaniv travlennia – aktual'na problema klinichnoi medytsyny. *Gastroenterologia*. 53(1). S. 1–6. <http://dx.doi.org/10.22141/2308-2097.53.1.2019.163450> [in Ukrainian].

6. Shevchuk, V. I., Beliaieva, N. M., Yavorovenko, O. B., Kurylenko, I. V. (2016). Sotsial'ni naslidky urazhen' vnutrishnikh orhaniv v uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii. *Zbirnyk naukovykh prats' spivrobitnykiv NMAPO imeni P. L. Shupyka*. № 25. S. 77–81. [In Ukrainian].

7. Venneman, K., Huybrechts, I., Gunter, M. J., Vandendaele, L. (2018). The epidemiology of *Helicobacter pylori* infection in Europe and the impact of lifestyle on its natural evolution toward stomach cancer after infection: A systematic review. *Helicobacter*, 23(3), 74–88. <https://doi.org/10.1111/hel.12483>

G. V. OSYODLO¹, V. V. DIACHENKO², Y. Y. KOTYK¹

¹ – Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine

² – Command of Medical Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Analysis of ten-year hospitalization indicator dynamics of military personnel in clinical centers of the Ministry of defense of Ukraine on peptic ulcer purpose

Summary

Purpose: *to study the ten-year dynamics of hospitalization rates for peptic ulcer of the gastroduodenal zone of military personnel to the clinical centers of the regions of the Ministry of Defense of Ukraine.*

Materials and methods. *We analyzed 50 reporting documents (form 2MED) from clinical centers of the regions of the Ministry of Defense of Ukraine for the period 2009–2018.*

Results and conclusions. *It has been established that over a ten-year period, 346,991 cases of diseases were registered in the clinical centers of the Ministry of Defense of Ukraine, of which 2.68% is a stomach ulcer and 20.51% is a duodenal ulcer. The analysis of the trends in the proportion of hospitalized patients with erosive and ulcerative lesions of the gastroduodenal zone during 2009–2018 demonstrated the absence of their significant changes in the structure of hospitalizations at the National Military Medical Clinical Center (MMCC) "Main Military Clinical Hospital" and MMCC of the Southern region – the value of the accuracy of the approximation of the calculated trends is significantly lower than 0.9, which indicates the unreliability of the calculated trends. Such data may indirectly reflect the stable situation with these diseases in the regions serving these medical institutions.*

Analysis of trends in the proportion of hospitalized people indicates an increase over 10 years in the number of hospitalizations for gastric ulcer in some regions: at the MMCC of the Northern region in the general group ($R^2=0.9638$) without significant dynamics of hospitalized permanent service and conscripts separately, and at the MMCC of the Western region in the conscript group ($R^2=0.9152$).

Analysis of trends in the proportion of hospitalized patients showed a significant decrease in the number of hospitalizations for peptic ulcer disease at the MMCC of the Western region (in the general group $R^2=0.9198$, in the subgroup of regular military personnel $R^2=0.9245$, in the subgroup of conscripts $R^2=0.9257$) and MMCC of the Central region (in the general group $R^2=0.9412$ due to the subgroup of military personnel of the permanent composition – $R^2=0.9289$).

The lower rates of the percentage of conscripts hospitalized for peptic ulcer disease in comparison with regular military personnel can be explained by the limited duration of military service of this contingent, strict criteria for medical examination when selecting candidates for conscript military service and their lack of participation in hostilities.

Key words: *peptic ulcer, gastroduodenal zone, dynamics of hospitalizations, military personnel.*

Г. В. ОСЕДЛО¹, В. В. ДЯЧЕНКО², Ю. Я. КОТИК¹

¹ – Українська військово-медична академія, г. Київ, Україна

² – Командование Медицинских Сил Украины, г. Київ, Україна

**Анализ десятилетней динамики показателей госпитализации
военнослужащих в клинические центры Министерства обороны Украины
по поводу язвенной болезни**

Резюме

Цель. Изучить десятилетнюю динамику показателей госпитализации по поводу язвенной болезни гастродуоденальной зоны военнослужащих в клинических центрах регионов Министерства обороны Украины.

Материалы и методы. Проанализированы 50 отчетных документов (форма 2МЕД) клинических центров регионов Министерства обороны Украины за период 2009–2018 гг.

Результаты и выводы. Установлено, что за десятилетний период в клинических центрах Министерства Обороны Украины зарегистрировано 346 991 случаев заболеваний, из которых 2,68% – язва желудка и 20,51% – язва двенадцатиперстной кишки. Проведенный анализ трендов доли госпитализированных больных с эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной зоны в течение 2009–2018 гг. продемонстрировал отсутствие существенных их изменений в структуре госпитализаций в Национальный военно-медицинский клинический центр (ВМКЦ) «Главный военный клинический госпиталь» и ВМКЦ Южного региона – значения достоверности аппроксимации рассчитанных трендов значительно ниже 0,9, что свидетельствует о ненадежности рассчитанных трендов. Такие данные могут косвенно отражать стабильную ситуацию с этими заболеваниями в регионах, обслуживающих эти лечебные учреждения.

Анализ трендов доли госпитализированных свидетельствует о росте в течение 10 лет количества госпитализаций по поводу язвенной болезни желудка в некоторых регионах: в ВМКЦ Северного региона в общей группе ($R^2=0,9638$) без существенной динамики госпитализированных постоянной службы и военнослужащих срочной службы отдельно и в ВМКЦ Западного региона в группе военнослужащих срочной службы ($R^2=0,9152$).

Анализ трендов доли госпитализированных продемонстрировал существенное снижение количества госпитализаций по поводу язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в ВМКЦ Западного региона (в общей группе $R^2=0,9198$, в подгруппе военнослужащих постоянного состава $R^2=0,9245$, в подгруппе военнослужащих срочной службы $R^2=0,9257$) и ВМКЦ Центрального региона (в общей группе $R^2=0,9412$ за счет подгруппы военнослужащих постоянного состава – $R^2=0,9289$).

Более низкие показатели доли госпитализированных по поводу язвенной болезни военнослужащих срочной службы по сравнению с военнослужащими постоянного состава можно объяснить ограниченным сроком военной службы этого контингента, жестким критериям медицинского осмотра при отборе кандидатов на срочную военную службу и отсутствием их участия в боевых действиях.

Ключевые слова: язвенная болезнь, гастродуоденальная зона, динамика госпитализаций, военнослужащие.

Стаття надійшла до редакції 18.05.2021.